

Mussurana montana (Franco, Marques & Puerto, 1997) (Serpentes: Dipsadidae): noteworthy records and an updated distribution map

Henrique Caldeira Costa¹, Patrícia Silva Santos^{1,2}, Wanderlei Pereira Laia³, Paulo C. A. Garcia¹ and Renato Silveira Bérnils⁴

1 Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Zoologia, Laboratório de Herpetologia.

Avenida Antônio Carlos 6627, Pampulha, 31270-901. Belo Horizonte, MG, Brazil

2 Faculdade de Viçosa. Rua Gomes Barbosa, 870, Centro, 36570-000. Viçosa, MG, Brazil

3 Faculdade do Futuro. Rua Duarte Peixoto, 259, Coqueiro, 36900-000. Manhuaçu, MG, Brazil

4 Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas. Rodovia BR-101 Norte km 60, 29932-540. São Mateus, ES, Brazil

* Corresponding author. E-mail: ccostah@gmail.com

Abstract: *Mussurana montana* is a poorly known dipsadid snake endemic to elevated areas in the Atlantic Forest of southeastern Brazil. After the examination of specimens deposited in scientific collections, we update the distribution range of *M. montana* with five new locality records, including its first record from the state of Rio de Janeiro, and a new northernmost and easternmost record in the state of Minas Gerais. These new data reinforce the distribution of *M. montana* within the mountain ranges of Serra da Mantiqueira and Serra do Mar, from 750–1,610 m above sea level.

Key words: Atlantic Forest; biogeography; Serra da Mantiqueira; Serra do Mar; snakes

The snake *Mussurana montana* (Franco, Marques & Puerto, 1997) is endemic to the Brazilian southeastern Atlantic Forest. Currently, its conservation status is classified as “Near Threatened” at the national level (Martins 2005), and as “Vulnerable” and “Near Threatened” in the states of São Paulo and Minas Gerais (Biodiversitas 2007; Marques et al. 2009), where the species is known to occur (Franco et al. 1997; Hartmann et al. 2009).

Mussurana montana can be diagnosed by the presence of 19 dorsal scale rows at midbody, eight supralabials (fourth and fifth contacting the eye), eight infralabials, 201–218 ventrals, 46–57 paired subcaudals; juveniles red dorsally, with a dark brown longitudinal vertebral stripe, and a light nuchal collar, while adults become dark brown dorsally and cream colored ventrally (Franco et al. 1997). Up to now *Mussurana montana* was recorded to high elevation areas (750–1,550 m above sea level [a.s.l.]) of two mountain ranges of Paleocene

origin (Almeida and Carneiro 1998) in southeastern Brazil: Serra da Mantiqueira and Serra do Mar (Franco et al. 1997; Hartmann et al. 2009). Within Serra da Mantiqueira, *M. montana* was recorded from seasonal semideciduous forests in Serra do Cervo, municipality of Poços de Caldas (21.7833° S, 46.5667° W), southeastwards in dense ombrophilous forests and ecotones with mixed ombrophilous forests in the municipalities of Camanducaia (22.8333° S, 46.1000° W), Sapucaí-Mirim (22.7500° S, 45.7500° W), Campos do Jordão (22.7395° S, 45.5914° W), and Guaratinguetá (22.6647° S, 45.3097° W, type locality) (Franco et al. 1997). Within Serra do Mar, the species was recorded from dense ombrophilous forests of the Serra da Bocaina, in Parque Estadual da Serra do Mar (Hartmann et al. 2009). Here, we add five new locality records for *M. montana* in southeastern Brazil, including the first record for the state of Rio de Janeiro and a new northernmost and easternmost record in the state of Minas Gerais.

New records from dense ombrophilous forests of Serra do Mar are based on specimens deposited in the Museu de Zoologia Dr. Adão José Cardoso, Universidade Estadual de Campinas (ZUEC), and Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ZUFRRJ): ZUEC-1430 from the municipality of Cunha (23.0750° S, 44.9583° W), in Serra da Bocaina, state of São Paulo; and ZUFRRJ-1764 from Serra das Araras, municipality of Petrópolis (22.3833° S, 43.1833° W), first species record from the state of Rio de Janeiro.

New records from seasonal semideciduous forests of Serra da Mantiqueira are based on specimens from the state of Minas Gerais, deposited in Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), and in the

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): MNRJ-7834 from Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Retiro Branco (21.7917° S, 46.5083° W), municipality of Poços de Caldas; UFJF-05 from Parque Estadual do Ibitipoca (21.7000° S, 43.8833° W), municipality of Lima Duarte; and UFMG-2073 (Figure 1) from RPPN Mata do Sossego (20.0700° S, 42.0761° W), municipality of Simonésia, new northernmost and easternmost record.



Figure 1. Live juvenile specimen of *Mussurana montana* (UFMG-2073), collected by PSS and WPL (collection permit SISBIO 25082-1) in RPPN Mata do Sossego, municipality of Simonésia, state of Minas Gerais, southeastern Brazil, new northernmost and easternmost record for this species.

Our findings greatly increase the extent of occurrence of *Mussurana montana* (Figure 2), add three new protected areas to the species range (RPPN Retiro Branco, Parque Estadual do Ibitipoca and RPPN Mata do Sossego), and reinforce its distribution pattern restricted to Serra do Mar and Serra da Mantiqueira, between 750–1,610 m a.s.l (mean elevation 1,230 m). Besides, it highlights distribution gaps that could suggest the occurrence of *M. montana* in another mountain ranges, like Serra dos Órgãos (the easternmost region of Serra do Mar, in Rio de Janeiro), Serra do Brigadeiro and Serra do Caparaó (both close to Simonésia, and the northernmost regions of Serra da Mantiqueira). All these areas were already the focus of herpetofaunal surveys (Valdujo et al. 2006; Levandeira-Gonçalves et al. 2007; Moura et al. 2012), but the absence of records of *M. montana* could be due to insufficient snake sampling or even a reflection of the species possible natural rarity.

ACKNOWLEDGEMENTS

We thank Fundação Biodiversitas for given access to RPPN Mata do Sossego and logistical support. To CNPq, FAPEMIG and USFish for financial support. Paulo Roberto Manzani (ZUEC), Ronaldo Fernandes and Paulo Passos (MNRJ), Sérgio P. de Carvalho-e-Silva and Daniel Fernandes (DZUFRJ), and Bernadete M. Sousa (UFJF) for allowing access to specimens under their care.




Figure 2. Geographic distribution map of *Mussurana montana*. See Table 1 for locality details. State acronyms: ES = Espírito Santo; MG = Minas Gerais; RJ = Rio de Janeiro; SP = São Paulo.

Table 1. Locality records of *Mussurana montana*. MG = Minas Gerais; RJ = Rio de Janeiro; SP = São Paulo. Collection acronyms: MNRJ = Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro; UFJF = Universidade Federal de Juiz de Fora; UFMG = Universidade Federal de Minas Gerais; ZUEC = Museu de Zoologia Dr. Adão José Cardoso, Universidade Estadual de Campinas; ZUF RJ = Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

State	Municipality, Locality	Latitude	Longitude	Elevation (m)	Source
MG	Camanducaia, Fazenda Levantina	-22.8333	-46.1000	1,350	Franco et al. 1997
MG	Lima Duarte, Parque Estadual do Ibitipoca	-21.7000	-43.8833	1,600	UFJF 05
MG	Poços de Caldas	-21.7833	-46.5667	1,200	Franco et al. 1997
MG	Poços de Caldas, RPPN Retiro Branco	-21.7917	-46.5083	1,370	MNRJ 7834
MG	Sapucaí-Mirim	-22.7500	-45.7500	900	Marques et al. 2004
MG	Simonésia, RPPN Mata do Sossego	-20.0700	-42.0761	1,300	UFMG 2073
RJ	Petrópolis, Serra das Araras	-22.3833	-43.1833	1,200	ZUF RJ 1764
SP	Campos do Jordão	-22.7333	-45.5833	1,610	Franco et al. 1997
SP	Campos do Jordão, Parque Estadual Campos do Jordão	-22.6833	-45.4667	1,550	ZUEC 1379, 1387, 1480, 1501; Marques et al. 2004
SP	Cunha	-23.0750	-44.9583	940	ZUEC 1430
SP	Guaratinguetá, rio Piaguüi, UHE Sodré (type locality)	-22.6647	-45.3097	750	Franco et al. 1997
SP	São Luís do Paraitinga, Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual Serra do Mar	-23.3500	-45.1167	1,000	Hartmann et al. 2009

LITERATURE CITED

- Almeida, F.F.M. and C.D.R. Carneiro. 1998. Origem e Evolução da Serra do Mar. *Revista Brasileira de Geociências* 28: 135–150. <http://rbg.sbgeo.org.br/index.php/rbg/article/download/617/310>
- Biodiversitas, Fundação. 2007. Revisão das Listas das Espécies da Flora e da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado de Minas Gerais—Relatório Final, Volume 3. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas. 104–142. http://www.biodiversitas.org.br/listas-mg/relatoriolistasmg_vol3.pdf
- Franco, F.L., O.A.V. Marques and G. Puorto. 1997. Two New Species of Colubrid Snakes of the Genus *Clelia* from Brazil. *Journal of Herpetology* 31: 483–490. <http://www.jstor.org/stable/1565599>
- Hartmann, P.A., M.T. Hartmann and M. Martins. 2009. Ecologia e história natural de uma taxocenose de serpentes no Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar, no sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* 9: 173–184. doi: [10.1590/S1676-06032009000300018](https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000300018)
- Levandeira-Gonçalves, M.A.P., F.V.O. Aguiar, J.V.C. Camargo, J.D. Barros-Filho and S.P. Carvalho-e-Silva. 2007. Levantamento preliminar da fauna de répteis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos; pp. 135–153, in: C. Cronemberger and E.B. Viveiros-de-Castro (eds.). *Ciência e Conservação na Serra dos Órgãos*. Teresópolis: Parque Nacional da Serra dos Órgãos. <http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/pesquisa-cientifica/19-uncategorised/139-ciencia-e-conservacao-na-serra-dos-orgaos.html>
- Marques, O.A.V., A. Eterovic and I. Sazima. 2004. Snakes of the Brazilian Atlantic Forest: an illustrated field guide for the Serra do Mar Range. Ribeirão Preto: Holos Editora. 205 pp.
- Marques, O.A.V., C.C. Nogueira, R.J. Sawaya, R.S. Bérnils, M. Martins, F.B. Molina, H. Ferrarezzi, F.L. Franco and V.J. Germano. 2009. Répteis; pp. 285–327, in: P. Bressan, M.C.M. Kierulff and A.M. Sugieda (eds.). *Fauna Ameaçada de Extinção no estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo / Secretaria do Meio Ambiente.
- Martins, M. 2005. Répteis; pp. 55–58, in: A.B.M. Machado, C.S. Martins and G.M. Drummond (eds.). *Lista da fauna Brasileira ameaçada de extinção, incluindo as listas das espécies quase ameaçadas e deficientes de dados*. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas.
- Moura, M.R., A.P. Motta, V.D. Fernandes and R.N. Feio. 2012. Herpetofauna da Serra do Brigadeiro, um remanescente de Mata Atlântica em Minas Gerais, Sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* 12: 209–235. doi: [10.1590/S1676-06032012000100017](https://doi.org/10.1590/S1676-06032012000100017)
- Valdujo, P.H., C.E.R. Candido and E.B. Rocha. 2006. Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Caparaó—Relatório de Herpetofauna. Brasília: MRS Estudos Ambientais. 53 pp.

Authors' contribution statement: HCC prepared the map and led the text writing, together with PSS, RSB, and PCAG. PSS and WPL made field works in RPPN Mata do Sossego, under the advisory of PCAG. RSB examined specimens of *M. montana* from several herpetological collections.

Received: August 2014

Accepted: April 2015

Academic editor: Diego José Santana